

FICHA TÉCNICA**TIPO DE FORMULACIÓN:** Concentrado Emulsionable EC**INGREDIENTES ACTIVOS:****PROCHLORAZ**Nombre químico: *N*-propyl-*N*-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]imidazole-1-carboxamide**CYPRODINIL**Nombre químico: 4-cyclopropyl-6-methyl-*N*-phenylpyrimidin-2-amine**USO:** Fungicida**FORMULADOR:** INTEROC S.A.

Dirección: Km 16½ vía Daule

TITULAR DEL REGISTRO: INTEROC S.A. SUCURSAL COLOMBIA.**INTEROC @ CUSTER**

Autopista Medellín Km 3.4

Centro Empresarial Metropolitano Modulo 3, Bodega 13

Cota – Colombia

Telf: 8415771 - 8415055

REGISTRO NACIONAL ICA No. 958**MODO DE ACCIÓN:**

BORDO, es un fungicida con acción sistémica y protectante-curativo. Luego de la aplicación foliar es captado por la planta y transportado vía acropetal por el xilema. Actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol. Inhibe la penetración y crecimiento micelial tanto en el interior como en la superficie de la hoja.



USO AGRÍCOLA

CULTIVOS	BLANCO BIOLOGICO	DOSIS	P.C	P.R
Cebolla Bulbo (<i>Allium cepa</i>)	Botritis (<i>Botrytis cinérea</i>)	1.2 cc/L o 240 cc/200 Litros de agua o 0.480 L/ha	7 días	6 horas
Fresa		1.2 cc/L o 0.480 L/ha	7 días	6 horas

Volumen de aplicación 400 litros de agua / Ha

*USO ORNAMENTALES			
CULTIVO	BLANCO BIOLOGICO	DOSIS	P.R
Rosa (<i>Rosa sp</i>)	Botritis (<i>Botrytis cinérea</i>)	1.2 cc/L	6 horas

Volumen de agua: 400 L/ha

P.C: Período de carencia

P.R: Período de reentrada

“Debido al alto número de especies ornamentales, que dificultan el desarrollo de pruebas de eficacia agronómica para el registro de este plaguicida en cada una de ellas, el usuario asume la responsabilidad del uso del producto en las especies de flores y plantas ornamentales no indicadas en el cuadro de uso, para lo cual deberá realizar una prueba preliminar con el objeto de evaluar el riesgo de fitotoxicidad del plaguicida antes de realizar una aplicación generalizada”

MODO DE EMPLEO

Calcule la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que pretende proteger. Colocar la mitad del agua en el tanque de mezcla, adicione la cantidad recomendada de **BORDO** y agite. Adicione el resto de agua.

Aplicar las dosis recomendadas cuando el Ingeniero Agrónomo lo recomiende, dependiendo de la presión de la enfermedad y rotar con productos de diferente modo de acción.

COMPATIBILIDAD

Se recomienda hacer pruebas preliminares a pequeña escala bajo la responsabilidad del usuario para demostrar que la mezcla sea físicamente compatible, eficaz y no fitotóxica bajo las condiciones locales de uso. Si se usa a las dosis recomendadas es poco probable que se presenten problemas de fitotoxicidad. **BORDO** es incompatible con productos de reacción alcalina, agentes ácidos, oxidantes y cobre.



PRECAUCIONES

En cultivos ornamentales se pueden utilizar fumigadoras con boquillas de cono hueco tipo APT LILA. Los tanques de preparación se deben lavar muy bien antes y después de preparar la mezcla del producto.

Nocivo para la fauna benéfica

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Toxico para el ganado, peligroso para los animales domésticos, toxico para los peces, no contaminar los lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

PRESENTACIONES A COMERCIALIZARSE EN COLOMBIA:

250 cc, 1 litro.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

III LIGERAMENTE PELIGROSO

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 018000916012

Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono (1) 2886012.

AVISO AL AGRICULTOR

El fabricante garantiza la composición y calidad del producto, no se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del agricultor.